

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

É causada pela formação de trombos (coágulos) no interior das veias profundas geralmente nas pernas. Conhecida como trombose, flebite, tromboflebite.



Em quem é mais comum?

Pode ocorrer em qualquer idade ou sexo, porém, é mais freqüente com idade mais avançada



Quais fatores que podem causar a doença?

A formação de trombos depende da lentidão da circulação sanguínea, de lesões nas veias ou aumento da coagulação do sangue.

Alguns fatores de risco são:

- Idade acima de 60 anos;
- Cirurgias;
- Imobilização prolongada (como em viagens);
- Uso de anticoncepcionais ou reposição hormonal para menopausa;
- Gravidez e Pós-parto;
- Distúrbios da coagulação;
- Obesidade;
- Câncer



Quais os sintomas que a doença causa?

- Dor intensa repentina
- Dor ao apertar a perna
- Inchaço repentino
- Alteração da cor (arroxeadas)
- Dilatação das veias superficiais
- Endurecimento muscular.

Quem precisa procurar o médico ?

Dor e ou inchaço repentinos principalmente se somente uma das pernas ou braços

Pessoas predispostas à doença ou expostas aos fatores de risco que podem causar a doença

Quais as complicações que podem decorrer da doença?

A principal complicação é a EMBOLIA PULMONAR que tem risco de morte, que pode causar subitamente dor no peito e falta de ar. Outra complicação que pode aparecer alguns anos depois são varizes com risco de formação de úlceras venosas

Quais exames são utilizados para pesquisar a doença?

- Exame de sangue chamado de Dímero D
- Ecografia (eco-doppler) das veias superficiais e profundas

Como pode ser tratada esta doença?

O tratamento geralmente é realizado com remédios anticoagulantes, porém, em alguns casos outros tratamentos podem ser definidos pelo médico